

短形四葉

直売や家庭菜園にもぴったり

# 惠沢 けいたく 23

OS交配

YS-26

食味抜群・美形

130 g. 23~24cm  
うどんこ病極めて強い

改良型



露地

トンネル 3~4月播き  
夏 秋 4~7月播き



株式  
会社

埼玉原種育成会

四葉胡瓜（試交YS-26）

# OS 交配 恵沢 23 改良型

抜群の色・テリ・食味。シーズンを通して安定した果形で秀品率は最高  
末期まで安定した草勢で作り易く、ウドンコ病に極めて強い品種

## 【特性】 主に露地栽培

適作型と 雌花着性	(露地トンネル) 3~4月播き (夏 秋) 4~7月播き	主枝 50~60% 側枝 50~60%	果実	大きさ	長さ 22~23cm 太さ 2.8~3cm で 130g 位
				形	首から尻まで良く整った円筒形で、果形の崩れが少なく果揃いが極めて良い
				色	濃緑色でテリも良く、暑くても退色しない
主枝	太めで中間節		果皮と果肉		トゲやシワが密で果皮も軟らかい 果肉は締っていて風味・食感も良い。
側枝	太め 短~中間節で発生は良い			収穫量	安定した収量構成でシーズンを通して 秀品多収となる
孫枝	短節間で発生は良い				安定した収量構成でシーズンを通して 秀品多収となる
葉	濃緑色で厚く、大きさは小葉				
草姿	葉柄は垂れずに受光性が良く力強い		耐病性	ウドンコ病・ベト病等に強い 特にウドンコ病には極めて強い	
草勢	旺盛で末期まで安定				

## 【栽培ポイント】・草勢の強い品種なので中庸な生育を図る・低温期の極端な早播きは避ける。

### ★栽植本数と育苗

露地ネット栽培では 3.5 本ぐらいが良い。  
育苗する場合は若苗過ぎたり老化苗に  
しない。接木台木は  
ブルームレスの場合、  
**OS 交配ゆうゆう一輝（黒タイプ）**  
ブルーム台木の場合、  
**OS 交配王金ウルトラ南瓜**  
が良い。

### ★施肥

元肥の量や質は一般的に準じてよいが  
やや少なめが良い。生育のスピードの  
早い作型では、初期～中期でのバラン  
スの良い肥効が、その後の草勢や品質  
収量に影響する。したがって、必ず施  
用前に土壤検定を行い、結果を基に施  
肥設計をすると良い。


追肥は、新葉の色や果形を見ながら  
行うが、1回の量を多くしない。肥料  
のやり過ぎには注意する。

### ★灌水


定植 2~3 日前に、タップリ行ってお  
き、定植日に土中水分の過不足が無い  
用に準備する。活着後は、ツルボケに  
ならないよう水のやり過ぎに注意する。

### ★整枝

主枝摘芯は、露地のネット栽培では 160cm 程度の低めが良い。  
下段の作枝を 1~2 本伸ばし、主枝、側枝の 2~3 本仕立てが  
良い。その他の側枝は、雌花着生を見ながら 1~2 節摘芯する。  
なお草勢が弱い場合は中上段の側枝を 1~2 本残し、その後の  
草勢に応じて放任もしくは摘芯をする。孫枝も雌花着生を見な  
がら 1~2 節で摘芯する。あるいは、草勢や全体に残してある  
枝数、込み具合を見て放任する。あまり放任し過ぎると、栄養  
生長に傾いたり、過繁茂による肥大不良の原因となったりする  
ので注意する。



露地短期作型



露地長期作型

### ★摘葉

最初の最盛期を過ぎる頃から、1回に 1~2 枚を限度として、  
古葉を摘み、新葉の充実を図ると良い。常に全体に亘り収穫果が  
見え隠れする程度に整えると良い。



きゅうり・かぼちゃ・メロン育成元  
株式会社 埼玉原種育成会  
〒346-0105 埼玉県久喜市菖蒲町新堀 2,616 番地  
TEL : 0480-85-0854 (代) FAX : 0480-85-0407



OS 交配種子 発売元  
株式会社 シード  
〒346-0105 埼玉県久喜市菖蒲町新堀 2,616 番地  
TEL : 0480-85-7211 (代) FAX : 0480-85-040